

McCANN ERICKSON 7710000231

מרכז תחום עמוד שידרה
במרפאה האורתופדית:
ד"ר אלכס גפטלר
טל. לזימון תורים: 03-5771188



מרכז רפואי
מעניי הישועה

מזיני פילוסופיה. מקצוענים עם נאמה.

לפרטים נוספים 03-577-1100 | רחוב הרב פוברסקי 17, בני ברק | www.mymc.co.il


כאבי גב אצל מבוגרים




מרכז רפואי
מעניי הישועה

מזיני פילוסופיה. מקצוענים עם נאמה.



חוליה תקינה



חוליה עם אוסטאופורוזיס



Vertebroplasty



שבר בחוליה

בהחדרת הצמנט

לאחר החדרת הצמנט

הצרות תעלת חוט השדרה

(Spinal Stenosis)

חוט השדרה נמצא ומוגן ע"י תעלה גרמית אשר נבנית ע"י הקשתות של החוליות. הצרות החלל יכולה לגרום ללחץ על חוט השדרה. תלונות החולה הן על קושי בהליכה למרחקים, צליעה לסרוגין, כאבים דו צדדיים לאורך הרגליים וחולשה. יש אבחנה מבדלת לתלונות אלה ונדרשת בדיקה מדוקדקת ולעיתים התייעצות בין רופאים ממספר מקצועות ואף בדיקות הדמיה נוספות. ככל שמתגבר הלחץ כך מחמירות התלונות. מטרת הטיפול הניתוחי היא הקטנת הלחץ על חוט השדרה משולב בקיבוע או בלעדי.

ספונדילוליסטזיס (Spondylolisthesis)

גלישה של חוליה ע"ג חוליה אחרת יכולה להתרחש בעקבות פגיעה ביציבות של עמוד השידרה. מספר גורמים יכולים לתרום לכך וביניהם סיבות מולדות, התפתחותיות וניוניות. הכאב יכול לנבוע משינויים מקומיים או לחץ על השורשים או חוט השדרה.

כאב גב תחתון באוכלוסייה

מעל גיל 60

כאב גב הוא התלונה השנייה בשכיחותה לפנייה לרופא משפחה (אחרי מחלות ויראליות). כ 90% מהאנשים מצינים שסבלו מכאב גב בשלב כלשהו בחייהם. המאפיינים והסיבות לכאב גב יכולות להשתנות ובחברתנו זאנו רוצים להתרכז בחולים מעל גיל 60.

ניוון המפרקים בין חוליתיים

כמו בכל הגוף גם בעמוד השדרה מתרחשים שינויים ניוונים המתבטאים בכאב גב המתגבר במהלך פעילות ונחלש במנוחה. הטיפול הראשוני הוא שמרני ע"י שימוש בנגדי כאב בצורת כדורים או בהזרקה. ברגע שנמנעת התנועה פוחת הכאב.

אוסטאופורוזיס (Osteoporosis)

אוסטאופורוזיס מתבטא בירידה בצפיפות העצם. בעקבות כך מופיעים שברים לאחר חבלות קלות ואף ללא חבלות כלל. שברים אלה מוגדרים כשברים פתולוגיים. הם מתרחשים בשכיחות גבוהה בעמוד השדרה כשברי דחיסה ומתבטאים לרוב בכאב גב או כאב עם הקרנה עקב לחץ על עצבים. נכון להיום קיימות מספר טכניקות ניתוחיות שמטרתן למנוע את הכאב הממושך בעקבות השברים הפתולוגיים. מדובר בשתי טכניקות זעיר פולשניות המבוצעות ע"י הזרקה של צמנט לתוך החוליה תחת שיקוף. הטכניקות הן ורטברופלסטיה וקיפופלסטיה. בורטברופלסטיה מוזרק צמנט ללא תיקון של עיוות החוליה, אשר נגרם בעיקבות השבר לעומת זאת בקיפופלסטיה מתבצע שיחזור חלקי של החוליה על ידי ניפוח בלון בחוליה בטרם הזרקת הצמנט. טכניקות אלה נמצאות בשימוש הולך ומתרחב. יתרון הוא בסבל מועט לחולה, שיקום מהיר ונסיגה בכאב.

